

VITTORIO ALIQUÒ  
QUARTO CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA  
DELLA FAUNA COLEOTTEROLOGICA DELLA REGIONE SICULA  
(*Clavigeridae, Histeridae, Chrysomelidae*)

**Clavigeridae**

*Claviger nebrodensis* RAGUSA

Specie endemica della Sicilia, descritta su esemplari delle Madonie raccolti entro nidi di *Lasius brunneus* LATR., non risulta ulteriormente citata, se non dallo stesso scopritore, che ne raccolse poi, presso Castelbuono, molti esemplari (RAGUSA, 1892), andati successivamente perduti.

Non è pertanto superfluo menzionare la cattura da parte mia e degli amici Roberto Mignani e Piero Cosimi di poco più di una trentina di esemplari di questa rara entità, raccolti — sempre in nidi di formiche siti sotto larghe pietre — ancora a Castelbuono, nell'esatto luogo indicato dal RAGUSA (1892), oggi raggiungibile comodamente per la via che porta verso S. Guglielmo, nell'aprile 1971.

**Histeridae**

*Saprinus beduinus* MARS.

Specie presente in Africa settentrionale, Spagna e Baleari, è in Italia rarissima, segnalata soltanto del Lazio e della Sicilia. Il RAGUSA (1892) menziona per l'Isola due soli esemplari a lui noti, provenienti da Mistretta e Piazza Armerina, e non sono state indicate ulteriori catture. La specie è però presente anche sulla costa, a Balestrate, donde proviene un esemplare da me raccolto il 24 maggio 1970, sotto pietra in terreno sabbioso umido.

*Hister pustulosus* GENE

Specie propria delle grandi Isole, Corsica, Sardegna e Sicilia, ove non è certo comune. È indicata dal RAGUSA (1892) solo di Messina e Castelbuono e non mi risultano successive segnalazioni, salvo quella recentissima di VIENNA (1971), che cita tre esemplari, rispettivamente provenienti da Piano della Battaglia, M. Antenna e Ficuzza. Ho raccolto sulle Madonie, a Piano Battaglia, a Piano Zucchi e a Portella Colla, vari esemplari appartenenti non soltanto alla forma tipica, con quattro macchiette di un rosso leggermente aranciato sulle elitre, ma anche alla ab. *nigripennis* BICK., ad elitre interamente nere, e a varie forme di passaggio, con una sola macchietta — ora quella posteriore, ora quella anteriore — per elitra, più o meno estesa e sfumata, che testimoniano una notevole variabilità della specie. Nella mia collezione è conservato inoltre un esemplare ad elitre fortemente rugose in senso trasversale.

*Xenonychus tridens* Duv.

Questa specie mediterranea assai rara, citata per pochissimi esemplari da vecchi Autori con la generica indicazione di «Sicilia» e quindi dal ROTTEMBERG (riportato dal RAGUSA, 1892) per due esemplari di Catania, è stata da me raccolta, ancora in due esemplari, nell'aprile 1970, vagliando la sabbia alla base delle erbe xerofile sulla spiaggia di Isola delle Femmine, presso Palermo, ove coabitava con i Tenebrionidi *Ammobius rufus*, *Trachyscelis aphodioides* e *Phaleria* sp., nonché con Scarabeidi del genere *Psammobius*. La specie in questione è segnalata anche di Sardegna e del Lazio.

Devo la determinazione, come quella di tutti gli Histeridae sopra menzionati, al Sig. Pierpaolo Vienna, cui rinnovo i miei più vivi ringraziamenti.

**Chrysomelidae**

*Polyconia spinicornis* KRAATZ.

Trattandosi di una specie assai rara, indicata della Spagna e genericamente di Sicilia, « Palermo », non è superfluo segnalarne la presenza nei dintorni di

Siracusa, ove, nel febbraio 1968, ne catturai un esemplare battendo le erbe di un prato incolto non lungi dalla fonte Ciane.

*Chrysolina marginata* L.

La specie, diffusa con varie razze lungo la catena alpina e appenninica, è presente in Sicilia con una forma endemica denominata dal BECHYNÉ ssp. *convexior*. Recentemente DACCORDI (1973) ha però dimostrato, studiando esemplari provenienti da Piano della Battaglia sulle Madonie, come tale denominazione sia in realtà sinonimo di *Chrysolina* (= *Chrysomela*) *dierythra* ROTTEMBERG, descritta, su un esemplare proveniente dall'Etna, come buona specie, ma in realtà da inquadrare sempre come sottospecie della *C. marginata* L.

La forma in questione, oltre che sull'Etna e sulle Madonie, è presente anche sui Nebrodi, a Portella Femmina Morta. Ne raccolsi in quest'ultima località due esemplari nel giugno 1974: stante la localizzazione a quote superiori ai 1500 metri s.m., ritengo che difficilmente tale entità endemica potrà essere reperita in altre località siciliane.

B I B L I O G R A F I A

- DACCORDI M., 1973 - Note sinonimiche su di alcuni Crisomelidi, *Bull. Ann. Soc. R. Belg. Entom.*, CIX, pp. 214-216, Bruxelles.
- MÜLLER G., 1949/53 - I Coleotteri della Venezia Giulia, catalogo ragionato, voi. II, *Coleoptera Phytophaga*, pp. 1-686, Trieste.
- PORTA A., 1926/34 - Fauna coleopterorum italica, voli. II e IV, Piacenza.
- RAGUSA E., 1882/1912 - Catalogo ragionato dei coleotteri di Sicilia. *Il naturalista siciliano*. Palermo.
- ROTTEMBERG A., 1871 - Beiträge zur Coleopteren Fauna von Sicilien, *Berliner Entom. Zeit.*, XV, p. 243.
- VIENNA P., 1917 - Gli Histeridae del Museo Civico di Storia Naturale di Verona. *Meni. Museo Civ. St. Nat.*, Verona, XIX, pp. 267-301.

Indirizzo dell'Autore: via Umberto Giordano 234, 90144 Palermo. 18