

**NOVA**

SPECIES EUROPEA SECTIONIS TRICHIDUM, A I. G. HELFER  
(PRAGENSIS).

(Séance du 4 septembre 1833.)

---

GEN. *Gnorimus*. LE PEL. et SERVILLE.

*Gnorimus Decempunctatus*, MIHI.

*Diagnosis.*

Pl. 17. B.

Niger, elytris supra sericcis thoracis margine laterali,  
punctis duobus versus scutellum impressis, punctis quinque  
in quavis elytra, segmentis analibus ad latera abdo-  
mineque fascia lata squamis albidis tecta.

VARIET. Elytris flavo-lateritiis.

Insectum Trichio 5-punctato affine, sed jam primo in-  
tuitu sufficienter distingendum.

*Descriptio comparativa.*

Trichius, FAB.

Trichius, FAB.

Gnorimus, LEP. et SERV.

Gnorimus, LEP. et SERV.

8-punctatus, FAB.

10-punctatus, MIHI.

*Thorax.*

Punctatus puncto utrinque ad basin. E squamis minutis albidis conformato.

Punctatus, lacunis quatuor constantibus impressus, quorum duo in medio versus marginem exteriorem, duo majora ad latera scutelli. Illa sic quoque margo lateralis sat lata, ast inequaliter squamulis albidis tecta.

*Scutellum.*

Glabrum punctis paucis ad basin impressum.

Punctis concinnis fere totum impressum.

*Elytra.*

Rugose punctata glabra punctis duobus, uno externo inferiore, altero interno superiore, squamulis albidis tecta.

Irregulariter obsolete punctata, versus apicem rugosa, striis duabus elevatis humerali media tertia, scricea, punctis 5-albidis, e squamulis formatis cum margine exteriore triangulum formantibus ornata.

VAR. Elytris flavo-lateriis margine toto suturaque fuscis.

*Segmenta abdominalia ad latera.*

Penultimum et ultimum squamulis albidis, nonnunquam deficientibus puncta formantibus obteria.

Ultima quinque constanter et sat magni squamulis albidis maculam formantibus ornata.

*Segmentum ultimum abdominale.*

Puncto è squamulis formato nonnunquam interrupto, saepius penitus deficiente.

Fascia abdominali late magnam partim abdominis tegente (ano nigro) maculisque aliquot illi nonnunquam adhærentibus.

*Tarsi.*

In comparatione multa gravitiores magnitudo et forma insecti penitus illa 8-punctati, qui invenitur in Italia et Gallia, quæ individua semper minora sunt illis quæ in Germania et Suecia reperiuntur.

Varietatem elytris flavo'lateritiis eadem quantitate ♂ et ♀ inveni. Nequaquam illa varietas forse insectum nuper exclusum habendum. Vidi nempe individua nondum conformata, ubi elytra ad medium elaborata fuerunt, fueruntque jam nigra.

Invenitur in catena montium Madonia, in parte septentrionali Sicilæ, in regione 3500—4000 pedes alta, degitque in truncis putridis Querciis, Ilicis, ubi etiam ejus larvæ vivunt.

B

2



1



Page 495.

Guerin del.

B 1. *Gnorimus Decem-punctatus.* 2. id. *Var.*