

BREVE NOTA

BRUNO MASSA

OSMODERMA HEREDITUM MERIDIONALE TAUZIN 1994
SINONIMO DI OSMODERMA CRISTINAE SPARACIO 1994
(Insecta Coleoptera Cetoniidae)

Osmoderma hereditum meridionale Tausin 1994 synonym of *Osmoderma cristinae* Sparacio 1994
(Insecta Coleoptera Cetoniidae).

Recentemente TAUZIN (1994) ha pubblicato una revisione del gen. *Osmoderma* Le Peletier et Audinet-Serville 1828, in cui descrive la nuova ssp. *Osmoderma hereditum* meridionale*, con elitre con strie nette e ben marcate nella metà superiore, taglia minore e forma meno convessa di *O. e. eremita* Scopoli. L'*holotypus* ed unico esemplare esaminato dall'Autore, conservato nella sua collezione, è etichettato: Mt. Nebrodi, Sicile (TAUZIN, 1994) e proviene da collezioni realizzate dal Failla Tedaldi (Tausin, *in litteris*), verosimilmente nel secolo scorso. La descrizione corrisponde molto bene con quella di *Osmoderma cristinae* Sparacio 1994, in particolare per le strie elitrali. Diversi altri caratteri distinguono abbastanza nettamente questa specie da *O. eremita* e da *O. lassallei* Barraud e Tausin (cfr. in particolare SPARACIO, 1994, pag. 309, Tab. 1, nonché le differenze edeagiche a pag. 308, Fig. 2, basate su cospicuo materiale).

Considerato che la data di pubblicazione di *O. cristinae* Sparacio è «31 gennaio 1994», mentre quella di *O. hereditum meridionale* Tausin è «agosto 1994», viene conseguentemente stabilita la sinonimia: *Osmoderma hereditum meridionale* Tausin 1994 = *Osmoderma cristinae* Sparacio 1994; questo ultimo nome resta quindi valido per la specie siciliana.

In merito alla distribuzione in Sicilia, ritengo che, per quanto si conosce attualmente, essa sia limitata alle sole Madonie e non a Madonie e Nebrodi, come scrive TAUZIN (1994). Infatti l'esemplare su cui Tausin ha effettuato la descrizione di *O. e. meridionale* era stato raccolto dal Failla Tedaldi, entomologo siciliano di Castelbuono che nel secolo scorso raccolse ingenti quantità di insetti nelle Madonie, inviandone a numerosi entomologi sparsi in tutta Europa; l'antico nome delle Madonie era proprio Nebrodi (sono infatti noti vari endemismi delle Madonie che portano il nome *nebrodensis*, il più noto è probabilmente l'Abete endemico delle Madonie, *Abies nebrodensis*), nome che invece oggi è assegnato alla catena montuosa più orientale in provincia di Messina. Pertanto

* TAUZIN (1994: pag. 195 e nota) scrive *Osmoderma eremitum*, ritenendo che il nome della specie debba intendersi come aggettivo e quindi declinandolo al neutro come il genere; tuttavia *eremita* è un sostantivo e pertanto il nome scientifico resta *Osmoderma eremita*.

il «Nebrodi» del cartellino dell'esemplare ex Failla Tedaldi, ora in coll. Tausin, deve intendersi «Madonie».

Infine in merito alla designazione del *neotypus* di *Osmoderma eremita* Scopoli, fissato da TAUZIN (1994) su un esemplare di Firenze conservato al Museum d'Histoire Naturelle di Paris, nonostante la distanza dalla località tipica (M. Carnioli, Slovenia) del taxon descritto da Scopoli, ricordo che l'art. 75 del Codice Internazionale di Nomenclatura Zoologica, tra le condizioni per la designazione di un *neotypus*, richiede che esso provenga da una località più vicina possibile a quella del tipo originale. Non essendo stata rispettata questa condizione, ritengo che il *neotypus* di *Osmoderma eremita* designato da Tausin non possa essere considerato valido e proporrei semmai la ricerca di un esemplare sloveno per effettuare questa designazione.

BIBLIOGRAFIA

- SPARACIO I., 1994 — *Osmoderma cristinae* n. sp. di Sicilia (Insecta Coleoptera: Cetoniidae). — *Naturalista sicil.*, 17 (1993): 305-310.
- TAUZIN P., 1994 — Le genre *Osmoderma* Le Peletier et Audinet-Serville 1828 (Coleopt., Cetoniidae, Trichiinae, Osmodermatini). Systématique, biologie et distribution. - *L'Entomologiste*, 50 (3): 195-214; 50 (4): 217-242.

Indirizzo dell'Autore — B. MASSA, Istituto di Entomologia agraria, Viale delle Scienze, 13 - 90128 Palermo.